

レジメン名

尿路上皮がん－GEM＋CBDCA＋PTX

1. 適応疾患：尿路上皮がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール						
投与方法・投与量 (day)	1	・・・	8	・・・	21～28	1	
GEM(ゲムシタビン) 1000mg/m ² /日	●		●				●
CBDCA(カルボプラチン) AUC 4・min./mL/日	●						●
PTX(パクリタキセル) 80mg/m ² /日	●		●				●

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 9.9mg ガスター 20mg 生食 100mL	点滴	30分
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60分
④	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30分
⑤	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	90分
⑥	生食 50mL	点滴	全開
⑦	ヘパリン Na ロック 1本	静注	フラッシュ用

Day2～3

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	ヘパリン Na ロック 1 本	静注	フラッシュ用

Day4

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg 生食 100mL	点滴	30 分

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 9.9mg ガスター 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	生食 100mL	点滴	30 分
③	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
④	ゲムシタビン _____mg 5%ブドウ糖 100mL	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開
⑥	ヘパリン Na ロック 1 本	静注	フラッシュ用

Day1、8 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60 分前