

レジメン名

尿路上皮がん－MVAC (MTX+VLB+DXR+CDDP)

1. 適応疾患：尿路上皮がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量 (day)	1	2	・	・	・	15	・	・	22	・	・	28	1	2
MTX(メソトレキセート) 30mg/m ² /日	●					●			●				●	
VLB(エクザール) 3mg/m ² /日		●				●			●					●
DXR(ドキシソルビシン) 30mg/m ² /日		●												●
CDDP(シスプラチン) 70mg/m ² /日		●												●

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ラクテック D 500mL	点滴	100mL/h
②	メソトレキセート _____mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	ヘパリン Na ロック 1 本	静注	フラッシュ用

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	KCL(20mEq/20mL) 0.5A ソルデム 1 500mL	点滴	120 分
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	エクザール _____mg 生食 100mL	点滴	30 分

④	硫酸 Mg 補正液(20mEq/20mL) ソルデム 1	0.4A 500mL	点滴	120 分
⑤	ドキシソルビシン 生食	_____mg 50mL	点滴	全開
⑥	マンニトール S	200mL	点滴	30 分
⑦	シスプラチン 生食 (シスプラチンと合計で 500mL)	_____mg _____mL	点滴	90 分
⑧	KCL(20mEq/20mL) ソルデム 1	0.5A 500mL	点滴	120 分
⑨	ソルデム 1	500mL	点滴	120 分
⑩	ヘパリン Na ロック	1 本	静注	フラッシュ用

Day3～4

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	ソルデム 1	500mL	点滴	120 分
②	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴 側管から	30 分
③	ソルデム 1	500mL	点滴	120 分
④	ヘパリン Na ロック	1 本	静注	フラッシュ用

Day5

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴	30 分

Day15, 22

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	ラクテック D	500mL	点滴	100mL/h
②	メソトレキセート 生食	_____mg 100mL	点滴	30 分
③	エクザール 生食	_____mg 100mL	点滴	30 分
④	ヘパリン Na ロック	1 本	静注	フラッシュ用