

レジメン名

尿路上皮がん－Enfortumab Vedotin＋Pembrolizumab

1. 適応疾患：根治切除不能な尿路上皮癌（一次治療）
2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量（day）	投与スケジュール					
	1	…	8	…	21	1
Pembrolizumab（キイトルーダ） 200mg/body/日	●					●
Enfortumab Vedotin（パドセブ） 1.25mg/kg/日（最大 125mg）	●		●			●

〈投与方法〉 3週を1サイクル

〈評価方法〉 画像検査

〈上限クール〉 Pembrolizumab は最大 35 サイクル(その後 EV 維持療法へ移行)

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロンバッグ 3mg	点滴	30分
②	パドセブ _____mg 生食 50mL 蒸留水（溶解用） 20mL 30mg：1V/Aq3.3mL で溶解 20mg：1V/Aq2.3mL で溶解	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	初回 30分 →2回目以降全開
④	キイトルーダ 200mg 生食 100mL	点滴	30分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	グラニセトロンバッグ 3mg	点滴	30分
②	パドセブ _____mg 生食 50mL 蒸留水（溶解用） 20mL 30mg : 1V/Aq3.3mL で溶解 20mg : 1V/Aq2.3mL で溶解	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開