

レジメン名

前立腺がん－Cabazitaxel (カバジタキセル)

1. 適応疾患 前立腺がん 基本的には去勢抵抗性前立腺がん(DTX 投与後)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール						
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	…	21	1
Cabazitaxel (ジェブタナ) 25mg/m ² /day	●						●
PSL (プレドニゾン) 10mg/day	●	●	●	●	●	●	●
ペグフィルグラスチム(ジーラスタ) 3.6mg/body			●				

※ペグフィルグラスチムは抗がん剤投与後 day2 以降 day4 以内に1回皮下注射を行う。

〈投与方法〉3週を1コース

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T	内服	ジェブタナ投与 1 時間前
②	デキサート ガスター 生食 6.6mg 20mg 100mL	点滴	30分
③	生食 100mL	点滴	30分以上
④	ジェブタナ 生食 mg 250mL	点滴	60分以上
⑤	生食 (③の残り) 100mL	点滴	全開

Day2～4 の間に1回投与

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ペグフィルグラスチム 3.6 mg	皮下注	

Day1～21(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾン 10mg	内服	