

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－CVP (CPA+VCR+PSL)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	・	・	・	・	・	・	・	21	1
CPA (エンドキサン) 750 mg/m ² /日	●													●
VCR (オンコビン) 1.4 mg/m ² /日	●													●
PSL (プレドニゾロン) 100 mg/body/日	●	●	●	●	●									●

〈投与方法〉3週を1コースとして

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL ×3	点滴	各 3～8 時間
②	グラニセトロンバッグ 3 mg 1 袋	点滴 側管から	30 分
③	エンドキサン _____mg 生食 500mL	点滴 側管から	120 分
④	オンコビン _____mg 生食 20mL	静注	ゆっくり
⑤	ラシックス 10mg	静注	治療後
⑥	ヘパリン Na ロック 1 筒	静注	

Day1～5（内服）

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	プレドニゾン(5)	20T	内服	分2(朝・昼)