

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－R-CVP (CPA+VCR+PSL)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性 B 細胞リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量（day）	1	2	3	4	5	6	・	・	21	1	2
Rituximab（リツキシマブ） 375mg/m ² /日	●									●	
CPA(エンドキサン) 750mg/m ² /日		●									●
VCR(オンコビン) 1.4mg/m ² /日		●									●
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日		●	●	●	●	●					●

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとして

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前
②	ソリタ T3 500mL ×2	点滴	各 2 時間
③	生食 50mL ソル・コーテフ 100mg	点滴	30 分
④	リツキシマブ _____mg 生食 500mL	点滴	25mL/1h →100mL/1h →200mL/h
⑤	ラシックス 10mg	静注	治療終了後
⑥	ヘパリン Na ロック 1 筒	静注	

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL ×3	点滴	各 3～8 時間
②	グラニセトロンバッグ 3 mg 1 袋	点滴 側管から	30 分
③	エンドキサン _____mg 生食 500mL	点滴 側管から	120 分
④	オンコビン _____mg 生食 20mL	静注	ゆっくり
⑤	ラシックス 10mg	静注	治療後
⑥	ヘパリン Na ロック 1 筒	静注	

Day2～6（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン(5) 20T	内服	分 2 (朝・昼)