

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－THP-COP (CPA＋VCR＋PSL)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	・	・	・	・	・	・	・	21	1
CPA(エンドキサン) 650mg/m ² /日	●													●
THP(ピノルビン) 40mg/m ² /日	●													●
VCR(オンコビン) 1.0mg/m ² /日	●													●
PSL(プレドニゾロン) 60mg/body/日	●	●	●	●	●									●

〈投与方法〉3週を1コースとして

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL×3	点滴	各 3～8 時間
②	アロカリス パロノセトロン 生食 235mg 0.75mg 100mL	点滴 側管から	30 分
③	ピノルビン 5%ブドウ糖液 _____mg 100mL	点滴 側管から	30 分
④	エンドキサン 生食 _____mg 500mL	点滴 側管から	120 分
⑤	オンコビン 生食 _____mg 20mL	静注 側管から	ゆっくり
⑥	ラシックス 10mg	静注 側管から	治療後
⑦	ヘパリン Na ロック 1 筒	静注	

Day1～5（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾン(5) 12T	内服	分2(朝・昼)