

レジメン名 **非ホジキンリンパ腫－R-THP-COP(CPA+THP+VCR+PSL)**

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性 B 細胞リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール												
	1	2	3	4	5	6	・	・	・	21	1	2	
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日	●											●	
CPA(エンドキサン) 600mg/m ² /日		●											●
THP(ピノルビン) 40mg/m ² /日		●											●
VCR(オンコビン) 1.0mg/m ² /日		●											●
PSL(プレドニン) 60mg/body/日		●	●	●	●	●							●

〈投与方法〉 3週を1コースとして

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 50mL ソル・コーテフ 100mg	点滴	30分
②	リツキシマブ _____mg 生食 500mL	点滴	25mL/1h →100mL/1h →200mL/h
③	生食 50mL	点滴	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	3 時間
②	アロカリス パロノセトロン 生食 235mg 0.75mg 100mL	点滴 側管から	30 分
③	ピノルビン 5%ブドウ糖 _____mg 100mL	点滴 側管から	30 分
④	エンドキサン 生食 _____mg 500mL	点滴 側管から	120 分
⑤	オンコビン 生食 _____mg 20mL	静注 側管から	ゆっくり
⑥	生食 50mL	点滴 側管から	全開

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ ロキソプロフェン 5T 1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前

Day2～6 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン(5) 12T	内服	分 2 (朝・昼)