

レジメン名

ホジキンリンパ腫－ABVD(ADM+BLM+VLB+DTIC)

1. 適応疾患：ホジキンリンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
	1	2	3	・	・	15			・	28	1	
DXR(ドキシソルビシン) 25mg/m ² /日	●					●						●
BLM(ブレオ) 10mg/m ² /日(最大 15mg/日)	●					●						●
VLB(エクザール) 6mg/m ² /日(最大 10mg/日)	●					●						●
DTIC(ダカルバジン) 375mg/m ² /日	●					●						●

〈投与方法〉 4週を1コース

〈評価方法〉

〈上限ルール〉

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	3時間
②	アロカリス パロノセトロン 生食 235mg 0.75mg 100mL	点滴 側管から	30分
③	エクザール 生食 _____mg 20mL	静注 側管から	ゆっくり
④	ドキシソルビシン 生食 _____mg 100mL	点滴 側管から	30分
⑤	ブレオ ソル・コーテフ 生食 _____mg 100mg 100mL	点滴 側管から	30分
⑥	ダカルバジン 生食 _____mg 250mL	点滴 側管から	60分
⑦	生食 20mL	静注 側管から	治療後