

レジメン名

ホジキンリンパ腫－A-AVD
(Brentuximab Vedotin+DXR+VLB+DTIC)

1. 適応疾患：進行期ホジキンリンパ腫(未治療の CD30 陽性のホジキンリンパ腫)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	2～4	・	15	16～18	・	28	1
Brentuximab Vedotin(アドセトリス) 1.2mg/kg/日(最大 120mg/日)	●			●				●
DXR(ドキシソルビシン) 25mg/m ² /日	●			●				●
VLB(エクザール) 6mg/m ² /日(最大 10mg/日)	●			●				●
DTIC(ダカルバジン) 375mg/m ² /日	●			●				●
ペグフィグラスチム(ジーラスタ) 3.6mg/body/日		●			●			

※ペグフィグラスチムは抗がん剤投与後

day2 以降 day4 以内に 1 回、day16 以降 day18 以内に 1 回皮下注射を行う。

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈上限クール〉 6 コース

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	4 時間
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
③	エクザール _____mg 生食 20mL	静注 側管から	ゆっくり
④	ドキシソルビシン _____mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
⑤	ダカルバジン _____mg 生食 250mL	点滴 側管から	60 分

⑥	ソル・コーテフ 生食	100mg 50mL	点滴 側管から	30 分
⑦	生食 (ルートフラッシュ用)	50mL	点滴 側管から	全開
⑧	アドセトリス 生食 蒸留水(溶解用 1V/10.5mLで溶解)	_____mg 100mL 20mL×2	点滴 側管から	60 分
⑨	生食	20mL	静注 側管から	治療後

Day2～4 の間に 1 回, Day16～18 の間に 1 回投与

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	pegfilgrastim 3.6 mg	皮下注	

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ロキソプロフェン(60mg) 1T レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	アドセトリス の 30 分前