

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－G-CVP(CPA＋VCR＋PSL) (2～8 サイクル)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性濾胞性リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	6	7	8	・	15	・	21	1	
Obinutuzumab (ガザイバ) 1000mg/body/日	●												●	
CPA(エンドキサン) 750mg/m ² /日		●												
VCR(オンコビン) 1.4mg/m ² /日		●												
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日		●	●	●	●									

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉 7 クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソル・メドロール 80mg 生食 50mL	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	60 分
③	ガザイバ 1000mg 生食 210mL	点滴	30 分毎に 25mL/h→ 50mL/h→100mL/h→ 200mL/h
④	生食 50mL	点滴	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	3 時間
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
③	オンコビン _____mg 生食 20mL	静注 側管から	ゆっくり
④	エンドキサン _____mg 生食 500mL	点滴 側管から	120 分
⑤	生食 50mL	点滴 側管から	全開

Day1(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	ガザイバ 投与 30 分前

Day2～5(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン 100mg (Day1 に mPSL80mg を投与するため、 PSL の投与は 4 日間とする。)	内服	