

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－G-Bendamustine (1 サイクル目)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性濾胞性リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量（day）	1	2	3	・	8	・	15	・	28	1
Obinutuzumab（ガザイバ） 1000mg/body/日	●				●		●			●
Bendamustine（ベンダムスチン） 90mg/m ² /日		●	●							

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉 1 クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソル・メドロール 80mg 生食 50mL	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	60 分
③	ガザイバ 1000mg 生食 210mL	点滴	30 分毎に 12mL/h→ 25mL/h→37 mL/h→ 50mL/h→62mL/h→ 75mL/h→87mL/h→ 100mL/h
④	生食 50mL	点滴	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パロノセトロン 生食 0.75mg 50mL	点滴	30 分
②	ベンダムスチン 生食 _____mg 50mL	点滴	10 分
③	生食 50mL	点滴	全開

Day3

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	ベンダムスチン 生食 _____mg 50mL	点滴	10 分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day8,15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソル・メドロール 生食 80mg 50mL	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	60 分
③	ガザイバ 生食 <u>1000mg</u> 210mL	点滴	30 分毎に 25mL/h→ 50mL/h→75mL/h→ 100mL/h
④	生食 50mL	点滴	全開

Day1,8,15(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	ガザイバ 投与 30 分前