

レジメン名

びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫－Pola-BR(1 サイクル目)

1. 適応疾患：再発又は難治性のびまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	・	・	・	・	・	21
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日	●								
Polatuzumab vedotin (ポライビー) 1.8mg/kg/日		●							
Bendamustine(ベンダムスチン) 90mg/m ² /日		●	●						

〈投与方法〉3 週を 1 コースとして

〈評価方法〉測定可能病変の画像検査、sIL2R、PET-CT など

〈上限クール〉1 クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソル・コーテフ 生食 100mg 50mL	点滴	30 分
②	リツキシマブ 生食 _____mg 500mL	点滴	25mL/1h →100mL/1h →200mL/h
③	生食 50mL	点滴	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	4 時間
②	ソル・コーテフ 100mg 生食 50mL	点滴	30 分
③	ポライビー _____mg 生食 100mL 蒸留水(溶解用) 20mL (30mg は 1V/1.8mL, 140mg は 1V/7.2mL で溶解)	点滴	90 分
④	パロノセトロン 1V 生食 50mL	点滴	30 分
⑤	ベンダムスチン _____mg 生食 50mL	点滴	10 分

Day3

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	1 時間
②	ベンダムスチン _____mg 生食 50mL	点滴	10 分

Day1(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前

Day2 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	ポライビー 投与 30 分前