

レジメン名

びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫—Pola-R-CHP

1. 適応疾患：未治療のびまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール										
	1	2	3	4	5	6	・	・	21	1	
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m <sup>2</sup> /日	●										●
Polatuzumab vedotin (ポライビー) 1.8mg/kg/日		●									
CPA(エンドキサン) 750mg/m <sup>2</sup> /日		●									
DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m <sup>2</sup> /日		●									
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日		●	●	●	●	●					

〈投与方法〉 3週を1コースとして

〈評価方法〉 評価可能病変の画像検査、sIL2R, PET-CT など

〈上限クール〉 6クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソル・コーテフ 生食 100mg 50mL	点滴	30分
②	リツキシマブ 生食 _____mg 500mL	点滴	25mL/1h →100mL/1h →200mL/h
③	生食 50mL	点滴	全開

## Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソル・コーテフ 100mg 生食 50mL	点滴	30分
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30分
③	生食 50mL	点滴	全開
④	ポライビー _____mg 生食 100mL 蒸留水(溶解用) 20mL (30mgは1V/1.8mL, 140mgは1V/7.2mLで溶解)	点滴	初回 90分 →2回目以降 30分で可
⑤	生食 50mL	点滴	30分
⑥	ドキシソルビシン _____mg 生食 100mL	点滴	30分
⑦	エンドキサン _____mg 生食 500mL	点滴	120分
⑧	生食 50mL	点滴	全開

## Day1(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30分前

## Day2(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	ポライビー 投与 30分前

## Day2~6(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	備考
①	プレドニゾロン 5mg 20T	内服	分2(朝・昼)