

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－R-CHOP (1 日投与) (初回禁)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性 B 細胞リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	・	・	・	・	21	1
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日	●										●
CPA(エンドキサン) 750mg/m ² /日	●										●
DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² /日	●										●
VCR(オンコビン) 1.4mg/m ² /日	●										●
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日	●	●	●	●	●						●

〈投与方法〉3 週を 1 コースとして

〈評価方法〉評価可能病変の画像検査、sIL2R, PET-CT など

〈併用レジメン〉

〈上限コース〉8 コース

※Day1 朝のプレドニゾロンは原則リツキシマブ投与 30 分前に内服

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	5 時間
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
③	生食 50mL	点滴 側管から	全開
④	リツキシマブ _____mg 生食 (RIT と合わせて計 250mL)	点滴 側管から	最初の 30 分：100mL/h その後 60 分：200mL/h
⑤	オンコビン _____mg 生食 20mL	静注 側管から	ゆっくり
⑥	ドキシソルビシン _____mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分

⑦	エンドキサン 生食	_____mg 500mL	点滴 側管から	120 分
⑧	生食	50mL	点滴 側管から	全開

Day1（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前

Day1～5（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン(5) 20T ※Day1 朝は原則リツキシマブ投与 30 分前	内服	分 2 (朝・昼)