

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－R-CHOP (RIT90 分投与) (初回禁)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性 B 細胞リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	6	・	・	・	21	1	2
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日	●										●	
CPA(エンドキサン) 750mg/m ² /日		●										●
DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² /日		●										●
VCR(オンコビン) 1.4mg/m ² /日		●										●
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日		●	●	●	●	●						●

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとして

〈評価方法〉 評価可能病変の画像検査、sIL2R, PET-CT など

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉 8 コース

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 200mL	点滴	2 時間
②	生食 50mL ソル・コーテフ 100mg	点滴 側管から	30 分
③	リツキシマブ _____mg 生食 (RIT と合わせて計 250mL)	点滴 側管から	最初の 30 分:100mL/h その後 60 分:200mL/h
④	生食 50mL	点滴 側管から	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	3 時間
②	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
③	オンコビン _____mg 生食 20mL	静注 側管から	ゆっくり
④	ドキソルビシン _____mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
⑤	エンドキサン _____mg 生食 500mL	点滴 側管から	120 分
⑥	生食 50mL	点滴 側管から	全開

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前

Day2～6 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン(5) 20T	内服	分 2 (朝・昼)