

レジメン名

悪性リンパ腫－Epcoritamab（1 サイクル目）

1. 適応疾患：抗 CD20 モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも 2 つの標準治療が施行された、再発/難治性大細胞型 B 細胞リンパ腫もしくは Grade3B の濾胞性リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量（day）	1	...	8	...	15	...	22	...	28
Epcoritamab(エプキンリ) 0.16 mg/body/日（皮下注）	●								
Epcoritamab (エプキンリ) 0.8 mg/body/日（皮下注）			●						
Epcoritamab (エプキンリ) 48 mg/body/日（皮下注）					●		●		

〈投与方法〉 28 日間を 1 コースとする

〈評価方法〉 末梢血、CT

〈併用レジメン〉 なし

〈上限クール〉 なし

Day1, 8, 15, 22

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ハルトマン 500mL	点滴	2 時間
②	デキサート 14.85mg 生食 100mL	点滴 側管から	30 分
③	アセリオ 1000mg	点滴 側管から	15 分
④	生食 100mL	点滴 側管から	30 分
⑤	エプキンリ Day1 : 0.16mg Day8 : 0.8mg Day15, 22 : 48mg	皮下注射	ゆっくり
⑥	ソリタ T3 500mL×3	点滴	各 8 時間

Day1, 8, 15, 22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ (10mg) 5T	内服	エプキンリ 投与 30-120 分前

Day2-4, 9-11, 16-18, 23-25 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デカドロン (4mg) 4T	内服	分 2 (朝・昼)