

レジメン名

びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫—Pola-R-CHP (RIT90 分投与) (初回禁)

1. 適応疾患：びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	6	・	・	21	1
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日	●									●
Polatuzumab vedotin (ポライビー) 1.8mg/kg/日	●									●
CPA(エンドキサン) 750mg/m ² /日	●									●
DXR(ドキシソルビシン) 50mg/m ² /日	●									●
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日	●	●	●	●	●					●

〈投与方法〉3週を1コースとして

〈評価方法〉評価可能病変の画像検査、sIL2R、PET-CT など

〈上限クール〉1クール目と合わせて6クール (7,8クール目にリツキシマブ単剤を追加することあり)

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 50mL ソル・コーテフ 100mg	点滴	30 分
②	リツキシマブ _____mg 生食 (RIT と合わせて計 250mL)	点滴	最初の 30 分:100mL/h その後 60 分:200mL/h
③	生食 50mL	点滴	全開
④	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg 生食 100mL	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

⑥	ポライビー 生食 蒸留水(溶解用) (30mg は 1V/1.8mL, 140mg は 1V/7.2mL で溶解)	_____mg 100mL 20mL	点滴	30 分
⑦	生食	50mL	点滴	30 分
⑧	ドキシルビシン 生食	_____mg 100mL	点滴	30 分
⑨	エンドキサン 生食	_____mg 500mL	点滴	120 分
⑩	生食	50mL	点滴	全開

Day1～5 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン 5mg 20T	内服	分 2 (朝・昼)

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前