

レジメン名

びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫－Pola-BR (RIT90 分投与) (初回禁)

1. 適応疾患：再発又は難治性のびまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名 投与方法・投与量 (day) | 投与スケジュール | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|----|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | ・ | ・ | ・ | 21 | 1 | 2 | |
| Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日 | ● | | | | | | | ● | | |
| Polatuzumab vedotin (ポライビー) 1.8mg/kg/日 | ● | | | | | | | ● | | |
| Bendamustine(ベンダムスチン) 90mg/m ² /日 | ● | ● | | | | | | ● | ● | |

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとして

〈評価方法〉 測定可能病変の画像検査、sIL2R、PET-CT など

〈上限クール〉 5 クール

Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|--|------------|--------------------------------------|
| ① | ソリタ T3 500mL | 点滴 | 5 時間 |
| ② | ソル・コーテフ 生食 100mg 50mL | 点滴 側管から | 30 分 |
| ③ | リツキシマブ 生食 _____mg (RIT と合わせて計 250mL) | 点滴 側管から | 最初の 30 分:100mL/h その後 60 分:200mL/h |
| ④ | 生食 100mL | 点滴 側管から | 30 分 |
| ⑤ | ポライビー 生食 蒸留水(溶解用) (30mg は 1V/1.8mL, 140mg は 1V/7.2mL で溶解) _____mg 100mL 20mL | 点滴 側管から | 30 分 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|------------|-----|
| ⑥ | パロノセトロン 生食 | 0.75mg 50mL | 点滴 側管から | 30分 |
| ⑦ | ベンダムスチン 生食 | _____mg 50mL | 点滴 側管から | 10分 |

Day2

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | | 投与方法 | ペース |
|-----|---------------|-----------------|------------|-----|
| ① | 生食 | 100mL | 点滴 | 1時間 |
| ② | ベンダムスチン 生食 | _____mg 50mL | 点滴 側管から | 10分 |

Day1(内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | | 投与方法 | ペース |
|-----|----------------------|----------|------|-------------------|
| ① | レスタミンコーワ ロキソプロフェン | 5T 1T | 内服 | リツキシマブ 投与 30分前 |