

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－R-CVP (RIT90 分投与) (初回禁)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性 B 細胞リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量（day）	1	2	3	4	5	6	・	・	21	1	2
Rituximab（リツキシマブ） 375mg/m ² /日	●									●	
CPA(エンドキサン) 750mg/m ² /日		●									●
VCR(オンコビン) 1.4mg/m ² /日		●									●
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日		●	●	●	●	●					●

〈投与方法〉3週を1コースとして

〈評価方法〉

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 200mL	点滴	2 時間
②	生食 50mL ソル・コーテフ 100mg	点滴 側管から	30 分
③	リツキシマブ _____mg 生食 (RIT と合わせて計 250mL)	点滴 側管から	最初の 30 分:100mL/h その後 60 分:200mL/h

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	3 時間
②	グラニセトロンバッグ 3mg 1 袋	点滴 側管から	30 分
③	オンコビン _____mg 生食 20mL	静注 側管から	ゆっくり
④	エンドキサン _____mg 生食 500mL	点滴 側管から	120 分

Day1（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前

Day2～6（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン 5mg 20T	内服	分 2（朝・昼）