

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－R-CVP (1日投与) (初回禁)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫 (CD20 陽性 B 細胞リンパ腫)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名 投与方法・投与量 (day)	投与スケジュール								
	1	2	3	4	5	・	・	21	1
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m <sup>2</sup> /日	●								●
CPA(エンドキサン) 750mg/m <sup>2</sup> /日	●								●
VCR(オンコビン) 1.4mg/m <sup>2</sup> /日	●								●
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日	●	●	●	●	●				●

〈投与方法〉 3週を1コースとして

〈評価方法〉 評価可能病変の画像検査、sIL2R, PET-CT など

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	5時間
②	グラニセトロンバッグ 3mg 1袋	点滴 側管から	30分
③	リツキシマブ _____mg 生食 (RIT と合わせて計 250mL)	点滴 側管から	最初の 30分:100mL/h その後 60分:200mL/h
④	オンコビン _____mg 生食 20mL	静注 側管から	ゆっくり
⑤	エンドキサン _____mg 生食 500mL	点滴 側管から	120分

## Day1～5 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン 5mg                      20T	内服	分2 (朝・昼)

## Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ                      5T ロキソプロフェン                      1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前