

レジメン名

原発性マクログロブリン血症－BDR 療法 (Bor 皮下注) (2、5 サイクル目)

1. 適応疾患：原発性マクログロブリン血症

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量 (day)	1	・	8	・	15	・	22	・	・	35
Bortezomib(ボルテゾミブ) 1.3mg/m ² /日 (皮下注)	●		●		●		●			
Rituximab (リツキシマブ) 375mg/m ² /日	●		●		●		●			
Dx(デキサート) 33mg/body/日	●		●		●		●			

〈投与方法〉 35 日を 1 コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 2 クール

Day1, 8, 15, 22

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 33mg 100mL	点滴	30 分
②	リツキシマブ 生食 _____mg 500mL	点滴	25mL/1h →100mL/1h →200mL/h
③	生食 50mL	点滴	全開
④	ボルテゾミブ 生食 (1V/1.2mL で溶解) _____mg 20mL	皮下注	

Day1, 8, 15, 22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ ロキソプロフェン 5T 1T	内服	リツキシマブ 投与 30 分前