

## レジメン名

## 非ホジキンリンパ腫－G-CHOP (2～6 サイクル)(G 短縮投与)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性濾胞性リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                     | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |  |
|-----------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|--|
| 投与方法・投与量（day）                           | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 | 1 |  |
| Obinutuzumab（ガザイバ）<br>1000mg/body/日     | ●        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    | ● |  |
| CPA(エンドキサン)<br>750mg/m <sup>2</sup> /日  | ●        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    | ● |  |
| DXR(ドキシソルビシン)<br>50mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    | ● |  |
| VCR(オンコビン)<br>1.4mg/m <sup>2</sup> /日   | ●        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    | ● |  |
| mPSL（ソル・メドロール）<br>80mg/日                | ●        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    | ● |  |
| PSL(プレドニゾロン)<br>100mg/body/日            |          | ● | ● | ● | ● |   |   |   |   |    |   |    |   |  |

〈投与方法〉 3 週を 1 コース(G-CHOP 6 コース→G 単独 2 コース)

〈評価方法〉

〈上限クール〉 5 クール

## Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                            | 投与方法       | ペース             |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| ①   | ソリタ T3<br>500mL                                    | 点滴         | 6 時間<br>(速度調節可) |
| ②   | ソル・メドロール<br>生食<br>80mg<br>50mL                     | 点滴<br>側管から | 15 分            |
| ③   | アロカリス<br>パロノセトロン<br>生食<br>235mg<br>0.75mg<br>100mL | 点滴<br>側管から | 30 分            |
| ④   | 生食<br>50mL                                         | 点滴<br>側管から | 30 分            |

悪性リンパ腫

|   |               |                        |            |                                            |
|---|---------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|
| ⑤ | ガザイバ<br>生食    | <u>1000mg</u><br>210mL | 点滴<br>側管から | 最初の 30 分 25mL/h<br>その後 225mL/h<br>(計 95 分) |
| ⑥ | 生食            | 50mL                   | 点滴<br>側管から | 30 分                                       |
| ⑦ | オンコビン<br>生食   | _____mg<br>20mL        | 静注<br>側管から | ゆっくり                                       |
| ⑧ | ドキソルビシン<br>生食 | _____mg<br>100mL       | 点滴<br>側管から | 30 分                                       |
| ⑨ | エンドキサン<br>生食  | _____mg<br>500mL       | 点滴<br>側管から | 120 分                                      |
| ⑩ | 生食            | 50mL                   | 点滴<br>側管から | 全開                                         |

Day1(内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量                    | 投与方法 | ペース              |
|-----|----------------------------|------|------------------|
| ①   | レスタミンコーワ 5T<br>ロキソプロフェン 1T | 内服   | ガザイバ<br>投与 30 分前 |

Day2～5(内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                                          | 投与方法 | ペース |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|-----|
| ①   | プレドニゾロン 100mg<br>(Day1 に mPSL80mg を投与するため、<br>PSL の投与は 4 日間とする。) | 内服   |     |