

レジメン名

非ホジキンリンパ腫－G-CVP (2～8 サイクル) (G 短縮投与)

1. 適応疾患：非ホジキンリンパ腫（CD20 陽性濾胞性リンパ腫）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール												
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	6	7	8	・	15	・	21	1
Obinutuzumab (ガザイバ) 1000mg/body/日	●												●
CPA(エンドキサン) 750mg/m ² /日	●												●
VCR(オンコビン) 1.4mg/m ² /日	●												●
mPSL (ソル・メドロール) 80mg/日	●												●
PSL(プレドニゾロン) 100mg/body/日		●	●	●	●								

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉 7 クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	6 時間 (速度調節可)
②	ソル・メドロール 生食 80mg 50mL	点滴 側管から	15 分
③	アロカリス パロノセトロン 生食 235mg 0.75mg 100mL	点滴 側管から	30 分
④	生食 50mL	点滴 側管から	30 分
⑤	ガザイバ 生食 1000mg 210mL	点滴 側管から	最初の 30 分 25mL/h その後 225mL/h (計 95 分)

⑥	生食	50mL	点滴 側管から	30 分
⑦	オンコビン 生食	_____mg 20mL	静注 側管から	ゆっくり
⑧	エンドキサン 生食	_____mg 500mL	点滴 側管から	120 分
⑨	生食	50mL	点滴 側管から	全開

Day1(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	ガザイバ 投与 30 分前

Day2～5(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	プレドニゾロン 100mg (Day1 に mPSL80mg を投与するため、 PSL の投与は 4 日間とする。)	内服	