

レジメン名

多発性骨髄腫－DBd（1 サイクル目）

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール																
投与方法・投与量（day）	1	2	・	4	5	・	8	9	・	11	12	・	15	16	・	21	1 (2 サイクル 目)
Daratumumab(ダラザレックス) 16mg/kg/日	●						●						●				●
Bortezomib(ベルケイド) 1.3mg/m ² /日（皮下注）	●			●			●			●							●
Dx(デキサート or レナデックス) 20mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●			●

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 1 クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 19.8mg 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 100mL	点滴	60 分
④	ダラザレックス 生食 _____mg 1000mL	点滴	～1h：50mL/h ～2h：100mL/h ～3h：150mL/h 3h～：200mL/h
⑤	ベルケイド 生食 (1V/1.2mL で溶解) _____mg 20mL	皮下注	
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day4, 11

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ベルケイド _____mg 生食 20mL (1V/1.2mL で溶解)	皮下注	

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 19.8mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 100mL	点滴	60 分
④	ダラザレックス _____mg 生食 500mL (初回投与開始時から 3h 以内に infusion reaction が認められなかった場合、生食 500mL で可)	点滴	～1h : 50mL/h ～2h : 100mL/h ～3h : 150mL/h 3h～ : 200mL/h
⑤	ベルケイド _____mg 生食 20mL (1V/1.2mL で溶解)	皮下注	
⑥	生食 50mL	点滴	全開

Day15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 19.8mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 100mL	点滴	60 分
④	ダラザレックス _____mg 生食 500mL (初回及び2回目投与時に最終速度が 100mL/h 以上で infusion reaction が認められなかった場合、100mL/h から開始可)	点滴	～1h : 100mL/h ～2h : 150mL/h 2h～ : 200mL/h
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day1（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	モンテルカスト(10mg) 1T	内服	治療開始 1～3h 前

Day1, 8, 15（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	治療開始 1～3h 前

Day2, 4, 5, 9, 11, 12, 16（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 20mg	内服	