

レジメン名

多発性骨髄腫－ELd (1 サイクル目)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	・	8	・	15	・	21	22	・	28	1
Elotuzumab(エムプリシティ) 10mg/kg/日	●		●		●			●			●
Dx(レナデックス) p.o. 28mg/body/日	●		●		●			●			●
Dx(デキサート) i.v. 6.6mg/body/日	●		●		●			●			●
Lenalidomide(レブラムド) 25mg/body/日	●	●	●	●	●	●	●				●

〈投与方法〉 4週を1コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 1クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg ガスター 20mg 生食 50mL	点滴	15分
②	生食 100mL	点滴	45分
③	エムプリシティ _____mg 生食 ※ _____mL ※体重 50kg 未満：150mL ※体重 50～90kg：250mL ※体重 90kg 超：350mL 蒸留水(溶解用) 100mL (300mg は 1V/13mL, 400mg は 1V/17mL で溶解)	点滴	～30分：30mL/h ～60分：60mL/h 60分～：120mL/h
④	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg ガスター 20mg 生食 50mL	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	45 分
③	エムプリシティ _____mg 生食 ※_____mL ※体重 50kg 未満：150mL ※体重 50～90kg：250mL ※体重 90kg 超：350mL 蒸留水(溶解用) 100mL (300mg は 1V/13mL, 400mg は 1V/17mL で溶解)	点滴	～30 分：180mL/h 30 分～：240mL/h
④	生食 50mL	点滴	全開

Day15, 22

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 6.6mg ガスター 20mg 生食 50mL	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	45 分
③	エムプリシティ _____mg 生食 ※_____mL ※体重 50kg 未満：150mL ※体重 50～90kg：250mL ※体重 90kg 超：350mL 蒸留水(溶解用) 100mL (300mg は 1V/13mL, 400mg は 1V/17mL で溶解)	点滴	300mL/h
④	生食 50mL	点滴	全開

Day1, 8, 15, 22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 28mg	内服	エムプリシティの 3～24 時間前
②	ジフェンヒドラミン 25～50mg アセトアミノフェン 300～1000mg	内服	エムプリシティの 30～90 分前

Day1～21（内服）

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レブラミド 25mg	内服	