

レジメン名

多発性骨髄腫一週 1 回 Kd (2 サイクル以降)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                                         | 投与スケジュール |     |   |     |    |     |    |     |    |   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|---|
| 投与方法・投与量 (day)                                              | 1        | ... | 8 | ... | 15 | ... | 22 | ... | 28 | 1 |
| Carfilzomib(カイゾ <sup>®</sup> ロリス)<br>70mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |     | ● |     | ●  |     |    |     |    | ● |
| Dx(デキサメタゾン)内服<br>40mg/body/日                                | ●        |     | ● |     | ●  |     | ●  |     |    | ● |

〈投与方法〉 4 週を 1 コースとして

〈評価方法〉 血液検査(M タンパク量)、画像検査

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1, 8, 15

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                                                                                        | 投与方法 | ペース    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ①   | 生食 100mL                                                                                                       | 点滴   | ルート確保用 |
| ②   | カイプロリス(70mg/m <sup>2</sup> ) _____mg<br>蒸留水(溶解用) 100mL<br>(10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解)<br>5%ブドウ糖液 100mL | 点滴   | 30 分   |
| ③   | 生食(①の残り) 100mL                                                                                                 | 点滴   | 全開     |

Day1, 8, 15, 22(内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量      | 投与方法 | ペース |
|-----|--------------|------|-----|
| ①   | デキサメタゾン 40mg | 内服   |     |