

レジメン名

多発性骨髄腫－IsaPd (1 サイクル目)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	...	8	...	15	...	21	22	...	28	1 (2 サイクル目)
Isatuximab(サークリサ) 10mg/kg/日	●		●		●			●			●
Pomalidomide(ポマリスト) 4mg/body/日	●	●	●	●	●	●	●				●
Dx(デキサート or レナデックス) 75 歳未満：40mg/body/日 75 歳以上：20mg/body/日	●		●		●			●			●

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 1 クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 75 歳未満：39.6mg 75 歳以上：19.8mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 50mL	点滴	15 分
④	サークリサ _____mg 生食 _____mL (全量で 250mL)	点滴	※体重別で下記投与の 速度を守ること
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※Day1 のサークリサ投与速度

<u>〈40kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 109mL/h
60～90 分	: 141mL/h
90～120 分	: 172mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 55mL/h	

<u>〈40～60kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 73mL/h
60～90 分	: 94mL/h
90～120 分	: 115mL/h
120～150 分	: 135mL/h
150～180 分	: 156mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 36mL/h	

<u>〈60～80kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 55mL/h
60～90 分	: 70mL/h
90～120 分	: 86mL/h
120～150 分	: 102mL/h
150～180 分	: 117mL/h
180 分～	: 125mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 27mL/h	

Day8,15,22

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 75 歳未満 : 39.6mg 75 歳以上 : 19.8mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 50mL	点滴	15 分
④	サークリサ _____mg 生食 _____mL (全量で 250mL)	点滴	※体重別で下記投与の速度を守ること
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※Day8,15,22 のサークリサ投与速度

<u>〈40kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 109mL/h
60～90 分	: 172mL/h
90～120 分	: 234mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 55mL/h	

<u>〈40～60kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 73mL/h
60～90 分	: 115mL/h
90～120 分	: 156mL/h
120 分～	: 167mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 36mL/h	

<u>〈60～80kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 55mL/h
60～90 分	: 86mL/h
90～120 分	: 117mL/h
120 分～	: 125mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 27mL/h	

Day1,8,15,22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	サークリサ投与 15～60 分前
②	ファモチジン (20mg) 1T	内服	サークリサ投与 15～60 分前

Day1～21 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ポマリスト 4mg	内服	分 1