

レジメン名

多発性骨髄腫－IsaPd (2 サイクル目以降)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	...	8	...	15	...	21	22	...	28	1
Isatuximab(サークリサ) 10mg/kg/日	●				●						●
Pomalidomide(ポマリドミド) 4mg/body/日	●	●	●	●	●	●	●				●
Dx(デキサート or レナデックス) 75 歳未満：40mg/body/日 75 歳以上：20mg/body/日	●		●		●			●			●

〈投与方法〉4 週を 1 コース

〈評価方法〉血清検査、画像検査など

〈上限クール〉

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 75 歳未満：39.6mg 75 歳以上：19.8mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 50mL	点滴	15 分
④	サークリサ _____mg 生食 _____mL (全量で 250mL)	点滴	※体重別で下記投与の 速度を守ること
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※Day1,15 のサークリサ投与速度

〈40kg 未満〉

0～60 分 : 109mL/h

60～90 分 : 172mL/h

90～120 分 : 234mL/h

IR 発生後の再開点滴速度 : 55mL/h

〈60～80kg 未満〉

0～60 分 : 55mL/h

60～90 分 : 86mL/h

90～120 分 : 117mL/h

120 分～ : 125mL/h

IR 発生後の再開点滴速度 : 27mL/h

〈40～60kg 未満〉

0～60 分 : 73mL/h

60～90 分 : 115mL/h

90～120 分 : 156mL/h

120 分～ : 167mL/h

IR 発生後の再開点滴速度 : 36mL/h

Day1, 15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	サークリサ投与 15～60 分前
②	ファモチジン (20mg) 1T	内服	サークリサ投与 15～60 分前

Day1～21 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ポマリスト 4mg	内服	分 1

Day8, 22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レナデックス 75 歳未満 : 40mg 75 歳以上 : 20mg	内服	