

レジメン名

多発性骨髄腫－DKd 皮下（1 サイクル目）

1. 適応疾患：再発又は難治性の多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール												
投与方法・投与量（day）	1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	23	・	28
Daratumumab(ダラキューロ) 1800mg/body/日（皮下注）	●			●			●			●			
Carfilzomib(カイプロリス) 20 mg/m ² /日	●	●											
Carfilzomib(カイプロリス) 56 mg/m ² /日				●	●		●	●					
Dx(デキサメタゾン)内服 20 mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●		

〈投与方法〉4週を1コースとして

〈評価方法〉血液検査(M タンパク量)、画像検査

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉1クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	60 分
③	ダラキューロ 1800 mg (15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約 3～5 分
④	カイプロリス (20mg/m ²) _____mg 蒸留水(溶解用) 20mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL (投与量が 100mg 超過時は 80mL にする)	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カイクロリス (20mg/m ²) _____mg 蒸留水(溶解用) 20mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL (投与量が 100mg 超過時は 80mL にする)	点滴	30 分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day8, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	60 分
③	ダラキューロ 1800 mg (15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約 3～5 分
④	カイクロリス (56mg/m ²) _____mg 蒸留水(溶解用) 100mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL (投与量が 100mg 超過時は 80mL にする)	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day9, 16

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カイプロリス (56mg/m ²) _____mg 蒸留水 (溶解用) 100mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
③	生食 (①の残り) 100mL	点滴	全開

Day22

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	60 分
③	ダラキューロ 1800 mg (15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約 3～5 分

Day1 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	モンテルカスト (10mg) 1T	内服	治療開始 1～3h 前

Day1, 8, 15, 22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ (10mg) 5T	内服	治療開始 1～3h 前

day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサメタゾン 20mg	内服	分 1