

レジメン名

多発性骨髄腫－DKd 皮下（3-6 サイクル目）

1. 適応疾患：再発又は難治性の多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール												
投与方法・投与量（day）	1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	23	・	28
Daratumumab(ダラキューロ) 1800mg/body/日（皮下注）	●						●						
Carfilzomib(カイプロリス) 56 mg/m ² /日	●	●		●	●		●	●					
Dx(デキサメタゾン)内服 20 mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●		

〈投与方法〉4週を1コースとして

〈評価方法〉血液検査(Mタンパク量)、画像検査

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉4クール

Day1, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
②	生食 100mL	点滴	60 分
③	ダラキューロ 1800 mg (15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約 3～5 分
④	カイプロリス (56mg/m ²) _____mg 蒸留水(溶解用) 100mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL (投与量が 100mg 超過時は 80mL にする)	点滴	30 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

Day2, 8, 9, 16

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カiproリス (56mg/m ²) _____mg 蒸留水(溶解用) 100mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL	点滴	30 分
③	生食(①の残り) 100mL	点滴	全開

Day1, 15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ (10mg) 5T	内服	治療開始 1～3h 前

Day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサメタゾン 20mg	内服	分 1