

レジメン名

多発性骨髄腫－DKd 皮下（7サイクル目以降）

1. 適応疾患：再発又は難治性の多発性骨髄腫

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                            | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |   |    |
|------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|---|----|
| 投与方法・投与量（day）                                  | 1        | 2 | ・ | 8 | 9 | ・ | 15 | 16 | ・ | 22 | 23 | ・ | 28 |
| Daratumumab(ダラキューロ)<br>1800mg/body/日（皮下注）      | ●        |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |   |    |
| Carfilzomib(カイプロリス)<br>56 mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        | ● |   | ● | ● |   | ●  | ●  |   |    |    |   |    |
| Dx(デキサメタゾン)内服<br>20 mg/body/日                  | ●        | ● |   | ● | ● |   | ●  | ●  |   | ●  | ●  |   |    |

〈投与方法〉4週を1コースとして

〈評価方法〉血液検査(Mタンパク量)、画像検査

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉4クール

Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                                                                                                                       | 投与方法             | ペース   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| ①   | アセリオ 1000mg                                                                                                                                   | 点滴               | 15分   |
| ②   | 生食 100mL                                                                                                                                      | 点滴               | 60分   |
| ③   | ダラキューロ 1800 mg (15mL)                                                                                                                         | 皮下注<br>(腹部に翼状針で) | 約3～5分 |
| ④   | カイプロリス (56mg/m <sup>2</sup> ) _____mg<br>蒸留水(溶解用) 100mL<br>(10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解)<br>5%ブドウ糖液 100mL<br>(投与量が 100mg 超過時は 80mL にする) | 点滴               | 30分   |
| ⑤   | 生食 50mL                                                                                                                                       | 点滴               | 全開    |

Day2, 8, 9, 15, 16

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                                                                                          | 投与方法 | ペース    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ①   | 生食 100mL                                                                                                         | 点滴   | ルート確保用 |
| ②   | カiproリス (56mg/m <sup>2</sup> ) _____mg<br>蒸留水(溶解用) 100mL<br>(10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解)<br>5%ブドウ糖液 100mL | 点滴   | 30 分   |
| ③   | 生食(①の残り) 100mL                                                                                                   | 点滴   | 全開     |

Day1 (内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量            | 投与方法 | ペース            |
|-----|--------------------|------|----------------|
| ①   | レスタミンコーワ (10mg) 5T | 内服   | 治療開始<br>1～3h 前 |

Day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 (内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量      | 投与方法 | ペース |
|-----|--------------|------|-----|
| ①   | デキサメタゾン 20mg | 内服   | 分 1 |