

レジメン名

多発性骨髄腫－Isatuximab (2 サイクル目以降)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫
2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
投与方法・投与量 (day)	1	・	・	15	・	・	28	1
Isatuximab(サークリサ) 20mg/kg/日	●			●				●

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉

Day1,15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソル・メドロール 125mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 50mL	点滴	15 分
④	サークリサ _____mg 生食 _____mL (全量で 250mL)	点滴	※体重別で下記投与の 速度を守ることに
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※Day1,15 のサークリサ投与速度

〈40kg 未満〉

0～60 分 : 55mL/h  
60～90 分 : 86mL/h  
90～120 分 : 117mL/h  
120 分～ : 125mL/h  
IR 発生後の再開点滴速度 : 27mL/h

〈60～80kg 未満〉

0～60 分 : 27mL/h  
60～90 分 : 43mL/h  
90～120 分 : 59mL/h  
120 分～ : 63mL/h  
IR 発生後の再開点滴速度 : 14mL/h

〈40～60kg 未満〉

0～60 分 : 36mL/h  
60～90 分 : 57mL/h  
90～120 分 : 78mL/h  
120 分～ : 83mL/h  
IR 発生後の再開点滴速度 : 18mL/h

Day1,15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	サークリサ投与 15～60分前
②	ファモチジン (20mg) 1T	内服	サークリサ投与 15～60分前