レジメン名

多発性骨髄腫－Isa+d (1 サイクル目)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫
2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
	1	・	8	・	15	・	22	・	28	1 (2 サイクル目)
Isatuximab(サークリサ) 20mg/kg/日	●		●		●		●			●
Dx(デキサメタゾン) 75歳未満：40mg/body/日 75歳以上：20mg/body/日	●		●		●		●			●

〈投与方法〉 4週を1コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 1クール

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 75歳未満：39.6mg 75歳以上：19.8mg 生食 100mL	点滴	30分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15分
③	生食 50mL	点滴	15分
④	サークリサ 生食 _____mg _____mL (全量で250mL)	点滴	※体重別で下記投与の速度を守ること
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※Day1のサークリサ投与速度

〈40kg未満〉

0～60分 : 55mL/h
 60～90分 : 70mL/h
 90～120分 : 86mL/h
 120～150分 : 102mL/h
 150～180分 : 117mL/h
 180分～ : 125mL/h
 IR発生後の再開点滴速度 : 27mL/h

〈60～80kg未満〉

0～60分 : 27mL/h
 60～90分 : 35mL/h
 90～120分 : 43mL/h
 120～150分 : 51mL/h
 150～180分 : 59mL/h
 180分～ : 63mL/h
 IR発生後の再開点滴速度 : 14mL/h

<u>〈40～60kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 36mL/h
60～90 分	: 47mL/h
90～120 分	: 57mL/h
120～150 分	: 68mL/h
150～180 分	: 78mL/h
180 分～	: 83mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 18mL/h	

Day8,15,22

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 75 歳未満 : 39.6mg 75 歳以上 : 19.8mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	生食 50mL	点滴	15 分
④	サークリサ _____mg 生食 _____mL (全量で 250mL)	点滴	※体重別で下記投与の速度を守ること
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※Day8,15,22 のサークリサ投与速度

<u>〈40kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 55mL/h
60～90 分	: 86mL/h
90～120 分	: 117mL/h
120 分～	: 125mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 27mL/h	

<u>〈60～80kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 27mL/h
60～90 分	: 43mL/h
90～120 分	: 59mL/h
120 分～	: 63mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 13mL/h	

<u>〈40～60kg 未満〉</u>	
0～60 分	: 36mL/h
60～90 分	: 57mL/h
90～120 分	: 78mL/h
120 分～	: 83mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 18mL/h	

Day1,8,15,22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	サークリサ投与 15～60分前
②	ファモチジン (20mg) 1T	内服	サークリサ投与 15～60分前