

レジメン名

多発性骨髄腫－Isa+d (2 サイクル目以降)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫
2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール									
投与方法・投与量 (day)	1	・	8	・	15	・	22	・	28	1
Isatuximab(サークリサ) 20mg/kg/日	●				●					●
Dx(デキサメタゾン) 75歳未満：40mg/body/日 75歳以上：20mg/body/日	●		●		●		●			●

〈投与方法〉4週を1コース

〈評価方法〉血清検査、画像検査など

〈上限クール〉

Day1,15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 75歳未満：39.6mg 75歳以上：19.8mg 生食 100mL	点滴	30分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15分
③	生食 50mL	点滴	15分
④	サークリサ 生食 _____mg _____mL (全量で250mL)	点滴	※体重別で下記投与の速度を守る
⑤	生食 50mL	点滴	全開

※Day1,15 のサークリサ投与速度

〈40kg未満〉

0～60分 : 55mL/h  
 60～90分 : 86mL/h  
 90～120分 : 117mL/h  
 120分～ : 125mL/h  
 IR発生後の再開点滴速度 : 27mL/h

〈60～80kg未満〉

0～60分 : 27mL/h  
 60～90分 : 43mL/h  
 90～120分 : 59mL/h  
 120分～ : 63mL/h  
 IR発生後の再開点滴速度 : 14mL/h

## 〈40～60kg 未満〉

0～60分 : 36mL/h

60～90分 : 57mL/h

90～120分 : 78mL/h

120分～ : 83mL/h

IR 発生後の再開点滴速度 : 18mL/h

## Day1,15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	サークリサ投与 15～60分前
②	ファモチジン (20mg) 1T	内服	サークリサ投与 15～60分前

## Day8,22 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサメタゾン 75歳未満 : 40mg 75歳以上 : 20mg	内服	