

レジメン名

多発性骨髄腫－IsaKd (2 サイクル目以降)

1. 適応疾患：再発難治性多発性骨髄腫
2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
	1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	23	・	28	1
Isatuximab(サークリサ) 10mg/kg/日	●						●							●
Carfilzomib(カイプロリス) 56mg/m <sup>2</sup> /日	●	●		●	●		●	●						●
Dx(デキサメタゾン)内服 20mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●			●

〈投与方法〉 4週を1コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉

Day1,15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アセリオ 1000mg	点滴	15分
②	生食 50mL	点滴	15分
③	サークリサ _____mg 生食 _____mL (全量で 250mL)	点滴	※体重別で下記投与の速度を守ること
④	カイプロリス (56mg/m <sup>2</sup> ) _____mg 蒸留水(溶解用) 100mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL (投与量が 100mg 超過時は 80mL)	点滴	30分
⑤	生食 50mL	点滴	全開

## ※Day1,15 のサークリサ投与速度

〈40kg 未満〉	
0～60 分	: 109mL/h
60～90 分	: 172mL/h
90～120 分	: 234mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 55mL/h	

〈60～80kg 未満〉	
0～60 分	: 55mL/h
60～90 分	: 86mL/h
90～120 分	: 117mL/h
120 分～	: 125mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 27mL/h	

〈40～60kg 未満〉	
0～60 分	: 73mL/h
60～90 分	: 115mL/h
90～120 分	: 156mL/h
120 分～	: 167mL/h
IR 発生後の再開点滴速度 : 36mL/h	

## Day2,8,9,16

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 100mL	点滴	ルート確保用
②	カイプロリス (56mg/m <sup>2</sup> ) _____mg 蒸留水 (溶解用) 100mL (10mg は 1V/5mL, 40mg は 1V/20mL で溶解) 5%ブドウ糖液 100mL (投与量が 100mg 超過時は 80mL)	点滴	30 分
③	生食 (①の残り) 100mL	点滴	全開

## Day1,15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ (10mg) 5T	内服	サークリサ投与 15～60 分前
②	ファモチジン (20mg) 1T	内服	サークリサ投与 15～60 分前

## Day1,2,8,9,15,16,22,23(内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサメタゾン 20mg	内服	分 1