

レジメン名

AL アミロイドーシスーDCyBorD 皮下（3－6 サイクル目）

1. 適応疾患：AL アミロイドーシス

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール													
投与方法・投与量（day）	1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	23	・	28	1
Daratumumab (ダラキューロ) 1800mg/body/日（皮下注）	●						●							●
Bortezomib (ベルケイト) 1.3mg/m ² /日（皮下注）	●			●			●			●				●
Cyclophosphamide (エンドキサン) 300mg/m ² /日	●			●			●			●				●
Dx (デキサート or レナデックス) 20mg/body/日	●	●		●	●		●	●		●	●			●

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 4 クール

Day1,15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 19.8mg 生食 100mL	点滴	30 分
②	アセリオ 1000mg	点滴	15 分
③	グラニセトロンバッグ 3 mg 1 袋	点滴 側管から	30 分
④	生食 100mL	点滴	30 分
⑤	ダラキューロ 1800 mg(15mL)	皮下注 (腹部に翼状針で)	約 3～5 分
⑥	ベルケイド _____mg 生食（1V/1.2mL で溶解） 20mL	皮下注	

AL アミロイドーシス

⑦	エンドキサン 生食	$\frac{\text{mg}}{500\text{mL}}$	点滴	120 分
⑧	生食	50mL	点滴	全開

Day8,22

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	デキサート 生食	$\frac{19.8\text{mg}}{100\text{mL}}$	点滴	30 分
②	グラニセトロンバッグ 3mg	1 袋	点滴 側管から	30 分
③	ベルケイド 生食 (1V/1.2mL で溶解)	$\frac{\text{mg}}{20\text{mL}}$	皮下注	
④	エンドキサン 生食	$\frac{\text{mg}}{500\text{mL}}$	点滴	120 分
⑤	生食	50mL	点滴	全開

Day1,15 (内服)

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ(10mg)	5T	内服	治療開始 1～3h 前

Day2,9,16,23 (内服)

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	レナデックス(4mg)	5T	内服	