

レジメン名

AL アミロイドーシスーDCyBorD 皮下（7 サイクル目以降）

1. 適応疾患：AL アミロイドーシス

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名 | 投与スケジュール | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|----|---|
| | 1 | . | . | . | . | . | . | 28 | 1 |
| 投与方法・投与量 (day) | | | | | | | | | |
| Daratumumab(ダラキューロ) 1800mg/body/日（皮下注） | ● | | | | | | | | ● |
| Dx(デキサート) 20mg/body/日 | ● | | | | | | | | ● |

〈投与方法〉 4 週を 1 コース

〈評価方法〉 血清検査、画像検査など

〈上限クール〉 18 コース

Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|--------------------------------|------------------|---------|
| ① | デキサート 生食 19.8mg 100mL | 点滴 | 30 分 |
| ② | アセリオ 1000mg | 点滴 | 15 分 |
| ③ | 生食 100mL | 点滴 | 60 分 |
| ④ | ダラキューロ 1800mg(15mL) | 皮下注 (腹部に翼状針で) | 約 3~5 分 |

Day1(内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|----------------------|------|----------------|
| ① | レスタミンコーワ(10mg) 5T | 内服 | 治療開始 1~3h 前 |