

レジメン名

再発・難治成人 T 細胞白血球リンパ腫・T 細胞リンパ腫
 –Mogamulizumab(ポテリジオ)

1. 適応疾患：CCR4 陽性の再発・難治成人 T 細胞白血病リンパ腫・T 細胞リンパ腫

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量 (day)	1	8	15	22	29	36	43	50	57			
Mogamulizumab(ポテリジオ) 1 mg/kg/日	●	●	●	●	●	●	●	●				

〈投与方法〉点滴静注 (1 週間間隔で 8 回)

〈評価方法〉末梢血・骨髄・画像

〈併用レジメン〉

〈上限クール〉

Day1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	3 時間
②	生食 ソル・コーテフ 50mL 100mg	点滴 側管	30 分
③	ポテリジオ 生食 _____mg 250mL	点滴 側管	2 時間

〈参考：添付文書より〉

① CCR4 陽性の成人 T 細胞白血病リンパ腫(ATL)

(1) 1mg/kg を 1 週間間隔で 8 回点滴静注

(2) 化学療法未治療の場合

他の抗悪性腫瘍剤と併用し、1mg/kg を 2 週間間隔で 8 回点滴静注

② 再発又は難治性の CCR4 陽性の末梢性 T 細胞リンパ腫(PTCL)

1mg/kg を 1 週間間隔で 8 回点滴静注

③ 再発又は難治性の皮膚 T 細胞リンパ腫(CTCL)

2018/8/21-以下へ変更

CCR4 陽性を確認する必要なし(検査を行うと査定される恐れあり)

1mg/kg を 1 週間間隔で 5 回点滴静注し、その後は 2 週間間隔で点滴静注