

レジメン名

慢性リンパ性白血病－R-FC (F-Ara-A+CPA) (1 サイクル目)

1. 適応疾患：CD20 陽性慢性リンパ性白血病

(※2020 年 12 月時点で RIT：先発品のみ適応あり)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	4	5	6	・	・	28
Rituximab (リツキサン) 375mg/m ² /日	●								
F-Ara-A(フルダラ) 25mg/m ² /日		●	●	●					
CPA(エンドキサン) 250mg/m ² /日		●	●	●					

〈投与方法〉4 週を 1 コース

〈評価方法〉末梢血所見、画像所見

〈上限クール〉1 コース

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ 5T ロキソプロフェン 1T	内服	リツキサン 投与 30 分前
②	ソリタ T3 500mL×2	点滴	各 2 時間
③	生食 50mL ソル・コーテフ 100mg	点滴	30 分
④	リツキサン _____mg 生食 500mL	点滴	25mL/1h →100mL/1h →200mL/h (2 回目以 100mL/h で開始可)
⑤	ラシックス 10mg	静注	治療終了後

Day2～4

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	ソリタ T3 500mL	点滴	3 時間
②	グラニセトロンバッグ 3mg	点滴 側管から	30 分
③	フルダラ _____mg 生食 250mL 注射用蒸留水 20mL (1V/Aq2.5mL で溶解)	点滴 側管から	60 分
④	エンドキサン _____mg 生食 250mL	点滴 側管から	60 分