

レジメン名

悪性軟部腫瘍－AIM(DXR＋IFM＋Mesna)

1. 適応疾患：悪性軟部腫瘍

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール											
投与方法・投与量 (day)	1	2	3	・	・	・	・	・	21	1	2	3
DXR(ドキシソルビン) 60mg/m ² /日	●									●		
IFM(イホマイド) 2500mg/m ² /日	●	●	●							●	●	●

〈投与方法〉 3～4 週を 1 コース

〈評価方法〉 2 コース毎に CT 等で効果判定

〈上限ルール〉

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アプレピタントカプセル(125mg) 1cap	内服	治療開始前
②	グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋 デキサート 6.6 mg	点滴	30 分
③	ドキシソルビン _____mg 生食 20mL	静注	ゆっくり
④	ソルデム 1 500mL	点滴	1 時間
⑤	ウロミテキサン 1000 mg	静注	IFM 開始前
⑥	イホマイド _____mg 生食 500mL	点滴	2 時間
⑦	ソルデム 1 500mL メイロン 7% 20mL	点滴	2 時間
⑧	ウロミテキサン 1000 mg	静注	IFM 開始 4 時間後
⑨	ソルデム 1 500mL メイロン 7% 20mL KCL 10mEq	点滴	2 時間
⑩	ソルデム 1 500mL メイロン 7% 20mL	点滴	2 時間

悪性軟部腫瘍

⑪	ウロミテキサン	1000 mg	静注	IFM 開始 8 時間後
⑫	マンニトール S	200mL	点滴	30 分
⑬	ソルデム 1 KCL	500mL 10mEq	点滴	2 時間

Day2～3

投与順	薬剤名と投与量		投与方法	ペース
①	アプレピタントカプセル(80mg) 1cap		内服	分 1(朝)
②	グラニセトロン 3mg バッグ デキサート	1 袋 6.6 mg	点滴	30 分
③	ソルデム 1	500mL	点滴	1 時間
④	ウロミテキサン	1000 mg	静注	IFM 開始前
⑤	イホマイド 生食	_____mg 500mL	点滴	2 時間
⑥	ソルデム 1 メイロン 7%	500mL 20mL	点滴	2 時間
⑦	ウロミテキサン	1000 mg	静注	IFM 開始 4 時間後
⑧	ソルデム 1 メイロン 7% KCL	500mL 20mL 10mEq	点滴	2 時間
⑨	ソルデム 1 メイロン 7%	500mL 20mL	点滴	2 時間
⑩	ウロミテキサン	1000 mg	静注	IFM 開始 8 時間後
⑪	マンニトール S	200mL	点滴	30 分
⑫	ソルデム 1 KCL	500mL 10mEq	点滴	2 時間