

レジメン名

悪性黒色腫－DTIC

1. 適応疾患：転移性悪性黒色腫

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                                      | 投与スケジュール |   |   |       |  |  |  |    |    |   |
|------------------------------------------|----------|---|---|-------|--|--|--|----|----|---|
| 投与方法・投与量（day）                            | 1        | 2 | 3 | ．．．．． |  |  |  | 20 | 21 | 1 |
| DTIC(ダカルバジン)<br>1000mg/m <sup>2</sup> /日 | ●        |   |   |       |  |  |  |    |    | ● |

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉 1 コースごとに評価

〈上限クール〉

Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量                                                  | 投与方法 | ペース   |
|-----|----------------------------------------------------------|------|-------|
| ①   | アロカリス 235mg<br>パロノセトロン 0.75mg<br>デキサート 9.9mg<br>生食 100mL | 点滴   | 30 分  |
| ②   | 生食 50mL                                                  | 点滴   | 全開    |
| ③   | ダカルバジン _____mg<br>生食 500mL                               | 点滴   | 120 分 |
| ④   | 生食 50mL                                                  | 点滴   | 全開    |

Day2～4(内服)

| 投与順 | 薬剤名と投与量        | 投与方法 | 投与時間      |
|-----|----------------|------|-----------|
| ①   | デカドロン (4mg) 2T | 内服   | 分 2 (朝・昼) |