

プロトコールNo.011210

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 登録区分 | 登録 | 入・外 |
|------|----|-----|

プロトコール名

肺がんーTarlatamab (1 サイクル目)

1. 適応疾患：既治療の小細胞肺癌

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名                             | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |    |   |   |    |
|---------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
| 投与方法・投与量 (day)                  | 1        | ・ | ・ | 8 | ・ | ・ | 15 | ・ | ・ | 28 |
| Tarlatamab (イムデトラ)<br>1mg/body  | ●        |   |   |   |   |   |    |   |   |    |
| Tarlatamab (イムデトラ)<br>10mg/body |          |   |   | ● |   |   | ●  |   |   |    |

〈投与方法〉4週を1サイクルとする

投与延期後、一定期間以上開いた場合は投与再開時の用法用量を再確認すること

⇒下部の添付資料参照

〈評価方法〉

〈上限クール〉1サイクル

Day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量   | 投与方法 | ペース  |
|-----|---|------|------|
| ①   | デキサート<br>生食<br>8.25mg<br>50mL   | 点滴   | 15分  |
| ②   | 生食<br>50mL  | 点滴   | 15分  |
| ③   | イムデトラ<br>生食<br>蒸留水(溶解用)<br>(1V/Aq 1.3mLで溶解し、1.1mLを使用)<br>(輸液安定化液<br>13mL)<br>1mg<br>236mL<br>20mL | 点滴   | 60分  |
| ④   | 生食<br>1000mL  | 点滴   | 240分 |

## Day8

| 投与順 | 薬剤名と投与量  | 投与方法 | ペース  |
|-----|--|------|------|
| ①   | デキサート 8.25mg<br>生食 50mL  | 点滴   | 15分  |
| ②   | 生食 50mL  | 点滴   | 15分  |
| ③   | イムデトラ 10mg<br>生食 233mL<br>蒸留水(溶解用) 20mL<br>(1V/Aq 4.4mL で溶解し、4.2mL を使用)<br>(輸液安定化液 13mL) | 点滴   | 60分  |
| ④   | 生食 1000mL  | 点滴   | 240分 |

## Day15

| 投与順 | 薬剤名と投与量  | 投与方法 | ペース  |
|-----|--|------|------|
| ①   | 生食 50mL  | 点滴   | 5分   |
| ②   | イムデトラ 10mg<br>生食 233mL<br>蒸留水(溶解用) 20mL<br>(1V/Aq 4.4mL で溶解し、4.2mL を使用)<br>(輸液安定化液 13mL) | 点滴   | 60分  |
| ③   | 生食 1000mL  | 点滴   | 240分 |

【イムデトラの休薬後の再開方法について】



イムデトラを1時間かけて点滴静注



本剤投与の1時間前に  
副腎皮質ホルモン剤を静脈内投与する



本剤投与後に輸液を行う

