

登録区分	登録	入・外
------	----	-----

プロトコール名

肺がん－CDDP+PEM (術後補助療法)

1. 適応疾患：非扁平上皮非小細胞肺癌（病理病期 II～III期）

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール										
投与方法・投与量 (day)	1	21	1
CDDP(シスプラチン) 75mg/m ² /日	●										●
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●										●

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉 4コース

初回投与日の1週間前～PEM最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000μg	筋注 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60分
④	ペメトレキセド ____mg 生食(PEM と合計で 100mL) ____mL	点滴	10分
⑤	マンニトール S 150mL	点滴	15分
⑥	シスプラチン ____mg 生食(CDDP と合計で 500mL) ____mL	点滴	60分
⑦	生食 500mL	点滴	60分
⑧	硫酸 Mg 補正液 4mEq ソリタ T3 500mL	点滴	60分

Day2~4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン (4mg) 2T	内服	分 2 (朝・昼)