

登録区分	登録	入・外
------	----	-----

プロトコール名

肺がん－Amivantamab＋CBDCA(AUC5)＋PEM (1 サイクル目)

1. 適応疾患：

EGFR-TKI 治療後の、EGFR 遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺がん
EGFR 遺伝子エクソン 20 挿入変異陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺がん

2. 投与量と投与スケジュール

体重 80kg 未満

薬剤名	投与スケジュール							
	1	2	...	8	...	15	...	21
CBDCA(カルボプラチン) AUC 5・min/ml/日	●							
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●							
Amivantamab(ライブリバント) 350mg/日	●							
Amivantamab(ライブリバント) 1050mg/日		●						
Amivantamab(ライブリバント) 1400mg/日				●		●		

体重 80kg 以上

薬剤名	投与スケジュール							
	1	2	...	8	...	15	...	21
CBDCA(カルボプラチン) AUC 5・min/ml/日	●							
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●							
Amivantamab(ライブリバント) 350mg/日	●							
Amivantamab(ライブリバント) 1400mg/日		●						
Amivantamab(ライブリバント) 1750mg/日				●		●		

〈投与方法〉 3週を1コース、1コース目のみ Day2・Day8・Day15に Amivantamab 投与あり

〈評価方法〉

〈上限ルール〉

初回投与日の1週間前～PEM最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000 μ g	筋注 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 19.8mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ペメトレキシド ____mg 生食(PEMと合計で100mL) ____mL	点滴	10分
④	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	60分
⑤	ファモチジン 20mg 生食 50mL	点滴	10分
⑥	生食 50mL	点滴	全開
⑦	ライブリバント 350mg 生食(合計で250mL) ____mL	点滴	投与開始時 50ml/h 投与開始2時間後 75ml/h
⑧	生食 50mL	点滴	全開

Day2

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 9.9mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ライブリバント 1050mg(体重 80kg 未満) ライブリバント 1400mg(体重 80kg 以上) 生食 (合計で 250mL) _____mL	点滴	投与開始時 80kg 未満 : 33ml/h 80kg 以上 : 25mL/h 投与開始 2 時間後 50ml/h
④	生食 50mL	点滴	全開

Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 50mL	点滴	ルート確保用
②	ライブリバント 1400mg(体重 80kg 未満) ライブリバント 1750mg(体重 80kg 以上) 生食 (合計で 250mL) _____mL	点滴	65ml/h
③	生食 50mL	点滴	全開

Day15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	生食 50mL	点滴	ルート確保用
②	ライブリバント 1400mg(体重 80kg 未満) ライブリバント 1750mg(体重 80kg 以上) 生食 (合計で 250mL) _____mL	点滴	85ml/h
③	生食 50mL	点滴	全開

Day1,2,8,15 (内服)

①	カロナール(500mg) レスタミンコーワ(10mg)	2T 5T	内服	ライブリバント 投与 30 分前
---	--------------------------------	----------	----	---------------------

Day3~4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間	
①	デカドロン(4mg)	2T	内服	分 2 (朝・昼)