

登録区分	登録	入・外
------	----	-----

プロトコール名

肺がん－Amivantamab＋CBDCA(AUC5)＋PEM (2 サイクル目)

1. 適応疾患：

EGFR-TKI 治療後の、EGFR 遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺がん

EGFR 遺伝子エクソン 20 挿入変異陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺がん

2. 投与量と投与スケジュール

体重 80kg 未満

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	2	...						21
CBDCA(カルボプラチン) AUC 5・min/ml/日	●								
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●								
Amivantamab(ライブリバント) 1400mg/日	●								

体重 80kg 以上

薬剤名	投与スケジュール								
投与方法・投与量 (day)	1	2	...						21
CBDCA(カルボプラチン) AUC 5・min/ml/日	●								
PEM(ペメトレキセド) 500mg/m ² /日	●								
Amivantamab(ライブリバント) 1750mg/日	●								

〈投与方法〉 3 週を 1 コース

〈評価方法〉

〈上限クール〉

初回投与日の1週間前～PEM最終投与の3週間(22日)後まで

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	パンビタン 1.0g	内服 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	分1(夕)
②	フレスミンS 1000μg	筋注 初回投与の1週間前 から最終投与日の 3週間後まで	9週間毎に

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	アロカリス 235mg パロノセトロン 0.75mg デキサート 9.9mg 生食 100mL	点滴	30分
②	生食 50mL	点滴	全開
③	ペメトレキセド _____mg 生食(PEMと合計で100mL) _____mL	点滴	10分
④	カルボプラチン _____mg 生食 250mL	点滴	60分
⑤	生食 50mL	点滴	全開
⑥	ライブリバント 1400mg(体重80kg未満) ライブリバント 1750mg(体重80kg以上) 生食(合計で250mL) _____mL	点滴	125ml/h
⑦	生食 50mL	点滴	全開

Day1(内服)

①	カロナール(500mg) 2T レスタミンコーワ(10mg) 5T	内服	ライブリバント 投与30分前
---	--------------------------------------	----	-------------------

Day2~4 (内服)

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	投与時間
①	デカドロン(4mg) 2T	内服	分2(朝・昼)