

## プロトコール名

乳がん－Perjeta＋Trastuzumab＋weeklyPTX (1 サイクル目)

## 1. 適応疾患

HER2 陽性の乳がん(術前・術後薬物療法の場合は、PTX は 12 回まで、Perjeta+T-mab の投与期間は合計 12 ヶ月まで)

## 2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
	1	・・・	8	・・・	15	・・・	21	1 (2 サイクル目以降)
パージェタ 840mg/body	●							● (420mg/body)
T-mab (トラスツズマブ) 8mg/kg (トラスツズマブ投与継続例は 6mg/kg)	●							● (6mg/kg)
PTX(パクリタキセル) 80mg/m <sup>2</sup>	●		●		●			●

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとする

## day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60 分前
②	デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	グラニセトロン 3mg <sup>ハック</sup> 1 袋	点滴	30 分
④	パージェタ 840mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑤	生食 100mL	点滴	60 分
⑥	トラスツズマブ(8mg/kg) _____ mg (投与継続例では 6mg/kg) 生食 250mL 注射用水 (溶解用) 20mL	点滴	90 分

⑦	パクリタキセル 生食	_____mg 250mL	点滴	60分
⑧	生食	50mL	点滴	全開

day8, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60分前
②	デキサート ファモチジン 生食	6.6mg 20mg 100mL	点滴 30分
③	グラニセトロン 3mg <sup>ハッグ</sup> 1袋	点滴	30分
④	パクリタキセル 生食	_____mg 250mL	点滴 60分
⑤	生食	50mL	点滴 全開