

プロトコール名

乳がん－Perjeta＋Trastuzumab＋weeklyPTX (2 サイクル目)

1. 適応疾患

HER2 陽性の乳がん(術前・術後薬物療法の場合は、PTX は 12 回まで、Perjeta+T-mab の投与期間は合計 12 ヶ月まで)

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール							
	1	・・・	8	・・・	15	・・・	21	1
パージェタ 420mg/body	●							●
T-mab(トラスツズマブ) 6mg/kg	●							●
PTX(パクリタキセル) 80mg/m ²	●		●		●			●

〈投与方法〉 3 週を 1 コースとする

day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60 分前
②	デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	グラニセトロン 3mg ^{ハッグ} 1 袋	点滴	30 分
④	パージェタ 420mg 生食 250mL	点滴	30 分
⑤	トラスツズマブ(6mg/kg) _____mg 生食 250mL 注射用水 (溶解用) 20mL	点滴	30 分
⑥	パクリタキセル _____mg 生食 250mL	点滴	60 分
⑦	生食 50mL	点滴	全開

day8, 15

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	レスタミンコーワ錠 5T	内服	PTX 投与 60 分前
②	デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL	点滴	30 分
③	グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋	点滴	30 分
④	パクリタキセル <u>mg</u> 生食 250mL	点滴	60 分
⑤	生食 50mL	点滴	全開