

プロトコール名

乳がん－Perjeta＋Trastuzumab＋Eribulin（1サイクル目）

1. 適応疾患：HER2 陽性の手術不能または再発乳がん

2. 投与量と投与スケジュール

薬剤名	投与スケジュール					
	1	・・・	8	・・・	21	1 (2サイクル目以降)
投与方法・投与量 (day)						
Pertuzumab(パージェタ) 840mg/body/日	●					● (420mg/body)
Trastuzumab(トラスツズマブ) 8mg/kg/日 (トラスツズマブ継続例は 6mg/kg/日)	●					● (6mg/kg)
Eribulin(エリブリン) 1.4mg/m <sup>2</sup> /日	●		●			●

〈投与方法〉3週を1コースとする

Day1

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 6.6mg 100mL	点滴	30分
②	パージェタ 生食 840mg 250mL	点滴	60分
③	生食 50mL	点滴	60分
④	トラスツズマブ 生食 注射用水(溶解用) _____mg 250mL 20mL	点滴	90分
⑤	エリブリン 生食 _____mg 50mL	点滴	5分
⑥	生食 50mL	点滴	全開

## Day8

投与順	薬剤名と投与量	投与方法	ペース
①	デキサート 生食 6.6mg 100mL	点滴	30分
②	エリブリン 生食 _____mg 50mL	点滴	5分
③	生食 50mL	点滴	全開