

プロトコールNo. 020236

登録日： 年 月 日

プロトコール名

乳がん-weeklyPTX+Trastuzumab(2サイクル目以降)

1. 適応疾患：HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

2. 投与量と投与スケジュール

| 薬剤名 | 投与スケジュール | | | | | | | |
|--|----------|-----|---|-----|----|-----|----|---|
| | 1 | ・・・ | 8 | ・・・ | 15 | ・・・ | 21 | 1 |
| PTX (パクリタキセル) 80 mg/m ² /日 | ● | | ● | | ● | | | ● |
| T-mab(トラスツズマブ) 6mg/kg/日 | ● | | | | | | | ● |

〈投与方法〉 3週を1コース

〈評価方法〉

〈上限ルール〉

day1

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|---|------|----------------|
| ① | レスタミンコーワ錠 5T | 内服 | PTX 投与 60分前 |
| ② | デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL | 点滴 | 30分 |
| ③ | グラニセトロン 3mg バッグ 1袋 | 点滴 | 30分 |
| ④ | パクリタキセル _____mg 生食 250mL | 点滴 | 60分 |
| ⑤ | トラスツズマブ(6mg/kg) _____mg 生食 250mL 注射用水(溶解用) 20mL | 点滴 | 30分 |
| ⑥ | 生食 50mL | 点滴 | 全開 |

day8, 15

| 投与順 | 薬剤名と投与量 | 投与方法 | ペース |
|-----|--|------|-----------------|
| ① | レスタミンコーワ錠 5T | 内服 | PTX 投与 60 分前 |
| ② | デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg 生食 100mL | 点滴 | 30 分 |
| ③ | グラニセトロン 3mg バッグ 1 袋 | 点滴 | 30 分 |
| ④ | パクリタキセル _____mg 生食 250mL | 点滴 | 60 分 |
| ⑤ | 生食 50mL | 点滴 | 全開 |